

NIEUWSBRIEF NO: 10

STICHTING WERKGROEP FLORAKARTERING DRENTHÉ (WFD)

Secretariaat: Kippenburgweg 5

7975 PP Uffelte (05215-406)

maart, 1986

Beste Atlas-medewerkers,

Hoewel tijdens het maken van deze Nieuwsbrief buiten bij wijlen de sneeuwvlokken omlaag dwarrelen en het ijslaagje op de sloten nauwelijks verdwijnt, wordt het toch hoog tijd iedereen weer eens te informeren over de activiteiten van de werkgroep. Met het nieuwe, flink vertraagde vegetatieseizoen voor de deur, kijkt iedereen natuurlijk met verlangen uit naar het moment om weer met het inventarisatieformulier, flora en andere attributen een eerste ronde te maken door de km-hokken, die men zich (in overleg met de coördinator) heeft voorgenomen dit jaar te onderzoeken.

Er staat met opzet km-hokken, omdat we met elkaar moeten proberen het tempo van het veldwerk wat op te schroeven. Sinds 1983 zijn in ongeveer 536 hokken verzameld (zie fig. 1). Dat is al een flink aantal, maar op het totaal van ruim 2600 km² dat de provincie Drenthé groot is, toch nog maar 20%.

Uit het kaartje blijkt ook dat in meer dan 100 van deze hokken door WFD-medewerkers al tenminste 100 soorten zijn vastgesteld. Van bijna 70 hokken is de WFD-lijst meer dan 200 soorten lang. Hok 233-555 (in de buurt van Assen) is volgens de WFD-gegevens tot nu toe het rijkst aan soorten: er zijn 301 verschillende planten gevonden.

Nog genoeg te doen dus, willen we ons doel, het publiceren van een Atlas van de flora van Drenthé, over een niet al te lange periode realiseren. Gelukkig staan we daar niet alleen voor; ook uit andere bronnen komen veel gegevens beschikbaar. Dat de bijdrage van de WFD-medewerkers heel belangrijk is blijkt bijvoorbeeld de kennis die we nu hebben over de verspreiding van Sleedoorn (*Prunus spinosa*, fig. 2). Het aantal WFD-aanvullingen op de bij de PPD van Drenthé beschikbare gegevens is aanzienlijk. Zoals te verwachten valt wordt deze vroegbloeiende soort voornamelijk in de lage en rijkere delen van Drenthé aangetroffen. In alle hoogveenontginningengebieden is Sleedoorn, afgezien van eventueel aangeplante exemplaren, die in dit kaartje buiten beschouwing zijn gelaten, volledig afwezig.



EXCURSIES

Zaterdag 24 mei: omgeving OOSTERHESSELEN

vertrek: 9.00 uur vanaf Café Scheepers, Burg. de Kockstraat 33, Oosterhesselen
(midden in het dorp bij de kerk en vlakbij een bushalte)

Zaterdag 28 juni: omgeving ASSEN, in samenwerking met het Rijksherbarium (Leiden)

vertrek: 10.00 uur vanaf station Assen.




Fig. 1 : Overzicht van km-hokken waarvan door WFD-medewerkers gegevens zijn verzameld

- minder dan 100 soorten bekend
- aantal soorten tussen 100 en 200
- meer dan 200 soorten vastgesteld

TWEE NIEUWE COÖRDINATOREN!

Zoals bekend kan iedereen bij zijn of haar **districtscoördinator** een (maar liefst wat meer) km-hokken opvragen om te inventariseren. De coördinatoren zullen ook van hun kant de medewerkers benaderen om hierover afspraken te maken. Medewerkers in het district **GIETEN** moeten hiervoor vanaf nu contact opnemen met

Ruud de Koning, Bosstraat 45, 9401 PS Assen, 05920- 12754

Voor de districten **ROSWINKEL** en **SLEEN** treedt nu

Kees van Berkel, Thebinckslaan 14, 9462 PV Gasselte, 05999- 65124

als coördinator op.

Ruud en Kees zijn de opvolgers van Ijzaak de Vries respectievelijk Luuc Bos en Bert Takman, die het coördinatorschap niet langer met andere activiteiten konden combineren.

Lubbert Dijk, die samen met Ate Dijkstra het veldwerk in de omgeving van **RODEN** coördineert is verhuist en woont nu:

Baggerveld 2, 9312 VE Terheijl, 05945 - 16270

Het telefoonnummer van Ben Hoentjen (district **MEPPEL**) is gewijzigd in 05927- 14354.

Voor de overige districten zijn er geen wijzigingen. Voor adressen en telefoonnummers, zie Handleiding pagina 7.




Fig. 2 : de verspreiding van Sleedoorn (*Prunus spinosa*) in Drenthe.

- gegevens PPD van Drenthe
- aanvullingen WFD

NIUW FORMULIER

Bij de verwerking van de gegevens tijdens de winterstop is gebleken dat het tot nu toe gebruikte formulier enige technische aanpassing van de "kop" behoeft.

Voor de medewerkers verandert er vrijwel niets. We maken wel van de gelegenheid gebruik in de soortenlijst aan te geven welke soorten in Drenthe zo algemeen voorkomen dat ze in vrijwel ieder hok te verwachten zijn. Op deze manier hopen we iedereen een geheugensteuntje te bieden bij het nagaan of juist deze soorten niet vergeten worden.

Dit nieuwe formulier wordt, met een toelichting over de veranderingen, in de loop van mei toegezonden aan iedereen die tot nu toe gegevens heeft ingestuurd.

Medewerkers, die nog steeds op de WFD-verzendlijst staan, maar waarvan nog nooit lijsten of waarnemingen zijn ontvangen, treffen bij deze Nieuwsbrief een aparte brief aan met het verzoek, via het opgavestrookje aan het secretariaat te laten weten of men nog geïnteresseerd is in de activiteiten van de WFD en / of voornemens is zelf nog wat gegevens te verzamelen. Alleen zij die uiterlijk 20 mei te kennen geven graag op de hoogte te willen blijven van de WFD-vorderingen, krijgen ook de nieuwe formulieren en de volgende Nieuwsbrief toegezonden.

Horen we niets, dan nemen we aan dat men geen tijd of interesse (meer) heeft voor de WFD en wordt men afgevoerd van onze verzendlijst.

HOU ZE UIT ELKAAR!

Sommige verwilderde en thans ingeburgerde siergewassen lijken vrij veel op elkaar en worden vaak verward. Daarom lijkt het nuttig om de belangrijkste verschillen van de volgende 3 paren soorten nog eens op een rijtje te zetten.

	<u>Japanse duizendknoop</u> (<i>Polygonum cuspidatum</i>)	<u>Sachalinse duizendknoop</u> (<i>Polygonum sachalinense</i>)
hoogte:	1 - 3 m.	1 - 4 m.
lengte bovenste bladeren:	5 - 12 cm.	1 1/2 - 30 cm.
aantal zijnerfbladeren:	4 - 6 paar	8 - 12 paar
voet van het blad:	afgeknot (recht afgesneden)	bijna hartvormig

Beide soorten komen vooral voor op ruderaal, vochtige, venige of humusrijke plaatsen. Vermoedelijk is de Japanse duizendknoop in Drenthe algemener dan de Sachalinse duizendknoop. Alleen de Sachalinse duizendknoop (*Polygonum sachalinense*) staat op de WFD-streeplijst (nummer 1875)

	<u>Canadese guldenroede</u> (<i>Solidago canadensis</i>)	<u>Late guldenroede</u> (<i>Solidago gigantea</i>)
hoogte:	0,65 - 1,50 m.	0,50 - 1,20 m.
bladeren:	aan beide zijden behaard	kaal of alleen de midden- nerf onderzijde kort behaard
stengel:	tenminste voor een deel behaard	kaal of alleen in de bloeiwijze behaard

Beide soorten komen voor op zowel droge als vochtige plaatsen. De indruk bestaat dat Late guldenroede (nummer 1221) vochtiger staat dan Canadese guldenroede (nummer 1890)

	<u>Theeboompje</u> (<i>Spiraea salicifolia</i>)	<u>Douglasspiraea</u> (<i>Spiraea douglasii</i>)
bladeren:	van onder kaal en over gehele lengte enkel tot dubbel getand	onderzijde wit of grijsviltig behaard en alleen de bovenste helft getand
bloemen:	wit of lichtroze (soms wat donkerder)	donker roze

Over de verspreiding van Douglasspiraea (nummer 1891) in Drenthe is wat betreft het milieu van deze soort nog weinig bekend. Theeboompje (nummer 1892) staat vooral op vochtige, vaak venige of humusrijke plaatsen.

Komt men bij het inventariseren een van deze soorten tegen, pak er dan even de flora bij om te kijken om welke soort het precies gaat: dat voorkomt foute waarnemingen in onze gegevens.

Een goed veldseizoen toegewenst en tot ziens
op een van de excursies,
Ate Dijkstra
Ben Hoentjen,
mede namens Hester, Eef, Ruud, Lubbert en Kees