

**Excursie NVZ naar
Epipactus helleborine
en ondersoorten in
Drenthe
6 aug. 2017
o.l.v. Hans Dekker**









Epipactus helleborine
ssp helleborine
Brede wespenorchis









**Mineerder
op blad van Melde
Rups van Gloriemot**

Epipactus helleborine
ssp Viridans






Ssp-Viridans

Het betreft planten met geheel groene bloemen. Slechts zelden zijn er zwakke rose-tinten te ontdekken op het hypochiel en andere onderdelen van de bloem. Het hypochiel eindigt in een vaak duidelijk zichtbare punt, die ook wat donkerder groen gekleurd is. De bouw van de plant lijkt op de nominaatvorm. Veelal zijn de planten fors en sierlijk. De middelste bladeren zijn veel langer dan de internodiën (gedeelten van de stengel tussen de bladeren). De bladeren zijn lancetvormig tot eirond.









Ssp Orbicularis

Korte, vrij stijve bijna cirkelronde, gegolfde bladeren, die tegen de stengel aanliggen

Gedrongen vorm en bladeren ongeveer even lang als de internodiën

Bovenste blad is verlengd en spits

Gedrongen bloemtros

Onderste schutbladen tweemaal zo lang als de bloemen





Ssp-moratoria

Bij deze variëteit zijn de bladeren donker- tot blauwachtig groen, waarbij de opvallend dunne stengel duidelijk heen en weer gebogen is. De bladeren zijn uitsluitend lancetvormig tot smal-lancetvormig, staan horizontaal van de stengel af, waarbij de uiteinden iets naar beneden gericht zijn.

Bovendien zijn de bladeren min of meer regelmatig in twee rijen aan de stengel gerangschikt. De bloeiwijze is opvallend los en armbloemig..

Als zeer belangrijk kenmerk na de bloeitijd zijn de gezwollen vruchtdozen, die opvallend horizontaal van de stengel afstaan.





Einde

Met dank aan
Hans Dekker
voor de excursie, de
informatie en een deel
van de foto's

Joop Verburg,
WFD 24 febr. 2018

